



OFNÆMISLYF

VAL Á MEÐFERÐUM Í LAUSASÖLU



Næming: Fyrsta útsetning fyrir ofnæmisvaka




Ofnæmisvaki (svo sem frjókorn) kemst í blóðrás

B-frumur örvast í plasmafrumur og seyta mótefnum (IgE)

Mótefni (IgE) festast á mastfrumur

Ofnæmisviðbragð: Önnur útsetning fyrir sama ofnæmisvaka



Ofnæmisvaki binst við mótefni á mastfrumum

Mastfrumur losa histamín

Ofnæmisviðbragð framkallað

OFNÆMI

EINKENNI

Einkenni ofnæmiskvefs

1. HNERRI

2. HÓSTI

3. KLÁÐI Í MUNNI, NEFI EÐA HÁLSI

4. BÓLGA EÐA BLÁMI Í KRINGUM AUGU

5. NEFRENNSLI

6. SVIMI

7. NEFSTÍFLUR

8. KLÁÐI, TÁRARENNSLI EÐA ROÐI Í AUGUM



OFNÆMISKVEF
EÐA ALMENNT
KVEF?

MEÐFERÐIR VIÐ OFNÆMI (ÁN LYFSEÐILS EÐA FREKARA INNGRIPS)




ANDHISTAMÍN

TÖFLUR Í LAUSASÖLU


Cetirizine
(Zensitin WH[®], Histasín[®],
Cetirizine Alvogen[®], Cetirizin STADA)





Clemastine
(Tavegyl[®])




Ebastine
(Kestine[®])



Fexofenadine
(Nefoxef[®])



Desloratadine
(Flynisse[®], Dasergin[®],
Desloratadine Alvogen[®])




Loratadine
(Clarityn[®], Lóritín[®])


ÖNNUR LYFJAFORM Í LAUSASÖLU

ANDHISTAMÍN

Levocabastine
(Livostin®)




Ketotifen
(Zaditen®)





BARKSTERAR

Mometasone
(Nasonex®, Mometason Apofri®,
Kalmente®, Mometasone Actavis®)



KRÓMÓNAR

Krómóglíkat
(Glinor®)



Fluticasone
(Flixonase®, Nasofan®)

ANNAÐ Í LAUSASÖLU

BARKSTERAR


Hydrocortisone
(Mildison®)



Á HÚÐ

STAÐDEYFANDI AMÍÐ

Lidocaine
(Xylocain®)



LJÓSMÆÐFERÐ VIÐ
OFNÆMISKVEFI





Útbrot



Kláði í munni



Bólgur í andliti



Bólgin tunga



Bólgur varir



Ógleði eða
uppköst



Magaverkir



Öndunar-
örðugleikar



Svimi



Niðurgangur

BRÁÐA- OFNÆMI

Zensitin WH – 10 mg cetirizine

